

Берлов О.Э., Берлов Э.Я.

Новый подвид *Pterostichus* (*Lenapterus*)
agonus Horn (Coleoptera, Carabidae)
из Якутии

Вестник Иркутской Государственной
Сельскохозяйственной Академии

Выпуск 4

Иркутск, 1997

с. 50

О.Э.Берлов, Э.Я.Берлов

В материалах рода *Pterostichus* из Якутии, любезно переданных авторам А.И.Аверенским, был обнаружен новый подвид жужелицы *Pterostichus (Lenapterus) agonus* Horn, который описывается ниже. Голотип хранится в коллекции авторов.

P. (Lenapterus) agonus averenskii O. Berlov et E. Berlov, ssp. n.

Голотип: самка, Якутия, Верхоянский хребет, верховья реки Келе, устье р. Кокчин, 1200 метров, горная тундра, 28.VII.1992 (Винокурова). Подвид назван в честь энтомолога Александра Ивановича Аверенского.

Тело черное. Голова и переднеспинка черные, блестящие. Надкрылья с металлически-медным оттенком, умеренно блестящие. Усики, ротовые части, голени и лапки черные. Бедра, вертлуги и тазики темно-бурые.

Голова гладкая. Переднеспинка с наибольшей шириной по середине, без пунктировки, с 2-мя базальными вдавлениями на каждой стороне. Наружные вдавления узкие, штриховидные, отделены отчетливым валиком от внутренних, более широких вдавлений. Боковой край равномерно закруглен к передним и задним углам. Задние углы округлены. Боковой кант широкий, к основанию расширяется. Основание заметно шире переднего края. Надкрылья без прищитковой поры. Плечи без зубчика, тупые. Предвершинные вырезки слабые, плика не заметна. Бороздки тонкие, прямые. Прищитковая бороздка отчетливая. 7-ая бороздка у плеч исчезает. Промежутки плоские, ровные, не прерванные. Третий промежуток с 4-мя щетинконосными порами. Передняя пора расположена у 3-ей бороздки, остальные у 2-ой. Эпистерны гладкие, без пунктировки. Задний тазик с 2-мя щетинками. Средние и задние бедра с 2-мя щетинками вдоль заднего края. Задний вертлуг с 1 щетинкой. Коготковые членики на нижней поверхности без шипиков. Анальный стернит с 4-мя щетинками. Размеры (мм): Общая длина тела 11,2; Д.надкрылий 6,1; Ш.надкрылий 4,5; Д.переднеспинки 2,4; Ш.переднеспинки 3,6; Ш.головы 2,4.

Самец неизвестен.

От номинативного подвида (для сравнения изучены 72 экземпляра с севера Сибири и Аляски) хорошо отличается не прерванными промежутками надкрылий, ровными бороздками, более округлыми боками и задними углами переднеспинки.